

การช่วยเลือดดูแลผู้ที่เป็ ไขเลือดออกอย่างไรให้ปลอดภัย

1.) ถ้าอาการไม่รุนแรงยังอยู่ในระยะที่ 1 ควรให้การรักษาตามอาการ ดังนี้

- ให้ผู้ป่วยนอนพักผ่อนมากๆ
- ถ้าไข้สูง ให้เช็ดตัวบ่อยๆ ให้ยาพาราเซตามอล ห้ามให้แอสไพริน เพราะจะทำให้เลือดออกมากขึ้น
- ถ้าเด็กชัก ก็ควรให้ยากันชัก หรือยานอนหลับ
- ให้อาหารอ่อน ข้าวต้ม โจ๊ก นม
- ให้ดื่มน้ำมากๆ จนปัสสาวะออกมากและใส
- ฝ้าสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด ถ้าสงสัยว่าเริ่มมีภาวะช็อค เช่น นอนซึม มือเท้าเย็น รับประทานอาหารไม่ได้ ปวดท้องมาก ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาล

2.) ถ้าผู้ป่วยมีอาการมาก ช็อคและเลือดออก ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลเพื่อแก้ไขอาการช็อค และภาวะเลือดออกโดยทันที




เราจะป้องกันไม่ให้เป็ ไขเลือดออกได้อย่างไร

- ระวังอย่าให้ยุงกัดเด็ก ควรนอนกางมุ้งหรือนอนในห้องที่มีมุ้งลวดเสมอ
- กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในบริเวณบ้าน อย่าให้มีน้ำขังในภาชนะและแอ่งน้ำต่างๆ เช่น กระบอง กะลา ควรทำลายเสีย หรือปรับพื้นอย่าให้เป็นหลุมเป็นบ่อที่มีน้ำขังไองน้ำควรมีฝาปิดให้มิดชิด
- งานรองตู้กับข้าว ควรเหน้าเดือดหรือใส่เกลือแกง 2 ช้อนชาต่อน้ำ 1 แก้ว



ไขเลือดออก



สำนักงาน ทต.คลองแสนแสบ

โทรศัพท์ ๐๓๘-๕๒๔-๐๕๐

ไข้เลือดออก

ไข้เลือดออก เป็นโรคติดเชื้อที่พบมากในเด็กอายุ 3 – 5 ขวบ เด็กอายุต่ำกว่า 1 ขวบ พบได้น้อย ผู้ใหญ่และเด็กโตอาจพบได้ แต่อาการมักไม่รุนแรง พบโรคนี้อันตรายในฤดูฝน ในช่วงที่มี ยุงลายชุกชุม โดยมีอาการไข้สูงลอย 4 – 5 วัน แล้วไข้ลด พร้อมกับมีอาการช็อค มีเลือดออกในที่ต่างๆ ทั่วร่างกาย ซึ่ง อาจทำให้เสียชีวิตได้

เป็นไข้เลือดออกได้อย่างไร

เกิดจากได้รับเชื้อไวรัสชื่อว่า เด็งกี ในการติดเชื้อครั้งแรก โดยทั่วไปเมื่อได้รับเชื้อไปประมาณ 3 - 15 วัน ผู้ป่วยจะมีไข้สูง คล้ายไข้หวัดใหญ่ และส่วนมากจะไม่มีเลือดออก มีส่วนน้อย ที่มีเลือดออกและมีอาการรุนแรง

ต่อมาเมื่อผู้ป่วยได้รับเชื้อซ้ำอีก ร่างกายจะเกิดปฏิกิริยา รุนแรง ทำให้หลอดเลือดฝอยเปราะ เกล็ดเลือดต่ำจึงทำให้น้ำเลือดไหลซึมออกจากหลอดเลือด และมีเลือดออกง่าย เป็นเหตุให้เกิดภาวะช็อค และเสียชีวิต

โรคนี้นิยมยุงลายเป็นพาหะนำโรค ยุงลายจะกัดคนที่ เป็น ไข้เลือดออกก่อน แล้วจึงไปกัดคนที่อยู่ใกล้เคียง (ในรัศมี ไม่เกิน 400 เมตร) แพร่เชื้อให้คนอื่นๆต่อไป ยุงลายชนิดนี้ เป็นยุงที่ออกหากินในเวลากลางวัน ชอบเพาะพันธุ์ตามแหล่งน้ำนิ่งใน บริเวณบ้าน เช่น จานรองตุ๊กกับข้าว น้ำในตุ่ม และหลุมที่มีน้ำขัง เป็นต้น



อาการของไข้เลือดออก

ภายหลังได้รับเชื้อไข้เลือดออกไปแล้ว มักจะแสดง อาการภายใน 3 – 15 วัน แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ

ระยะที่ 1 ระยะไข้สูง เริ่มด้วยอาการไข้สูงทันที 39 – 40 °C ไข้จะสูงลอยตลอดเวลา กินยาลดไข้ก็มักจะ ไม่ลด หน้าแดง ตาแดง ปวดศีรษะ กระหายน้ำ เบื่ออาหาร ซึม ปวดท้องบริเวณชายโครงขวา อาเจียน และไอ บ้างเล็กน้อย บางรายอาจมีเพ้อและชักได้ ในราววันที่ 3 ของไข้อาจมีผื่นแดง ไม่คันขึ้นตามแขน ขาและลำตัว บางคน อาจมีจุดเลือดออกเป็นจุดแดงเล็กๆ ขึ้นตามหน้า แขน ขา ในช่องปาก เพดาน กระพุ้งแก้ม บางรายมีเลือดกำเดาไหล หรือเลือดออกตามไรฟันด้วย ส่วนใหญ่จะมีไข้ และอาการ อยู่ 5 – 7 วัน แล้วค่อยๆดีขึ้น แต่ถ้าเป็นมากก็จะปรากฏ อาการระยะที่ 2

ระยะที่ 2 ระยะช็อคและมีเลือดออก อาการจะเกิดขึ้น ในช่วงวันที่ 3 – 7 ของโรค เป็นช่วงวิกฤตและอันตราย ของโรค อาการไข้จะลดลง แต่ผู้ป่วยจะมีอาการทรุดหนัก ซึม กระสับกระส่าย ตัวเย็น เหงื่อออกปัสสาวะน้อย ไม่รู้สึกตัว ปากเขียว ซีพจรคลำไม่ได้ อาจมีเลือดกำเดาไหล อาเจียนเป็นเลือด ถ่ายอุจจาระเป็นเลือด ระยะช็อค จะปรากฏอยู่ประมาณ 1 – 2 วัน ถ้าได้รับการรักษาที่ดี สามารถผ่านช่วงวิกฤตได้ก็จะเข้าสู่ระยะที่ 3

ระยะที่ 3 ระยะฟื้นตัว อาการต่างๆจะดีขึ้นอย่างรวดเร็ว ฟื้นตัวเข้าสู่สภาพปกติ เริ่มอยากกินอาหาร อาการต่างๆจะเป็นปกติไม่เกิน 9 วัน

อาการแทรกซ้อน

1. ภาวะเลือดออกรุนแรง
2. ภาวะช็อค
3. ภาวะมีน้ำในช่องปอด จากการมีเลือดไหลซึมจาก หลอดเลือด



“ ยุงลาย เป็นพาหะนำเชื้อไข้เลือดออก ”

